



Ziemnice, dnia 9 grudnia 2020 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W LEGNICY

**Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego
Plac Słowiański 1
59-220 Legnica**

Nasz znak:
PIWz.522.329.2020

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy przesyła informacje na temat aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej **wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)**. W związku z rozpoczęciem sezonu migracji dzikich ptaków oraz występowaniem w ostatnim czasie ognisk HPAI na terenie Rosji, Kazachstanu, Niemiec i Królestwa Niderlandów należy uznać, że ryzyko wystąpienia HPAI na terenie Polski jest bardzo wysokie.


Ponadto na dzień 9.12.2020r stwierdzono już w Polsce w drugim półroczu bieżącego roku 5 ognisk HPAI.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności bliską odległość powiatu legnickiego od występujących w tym półroczu ognisk (województwo wielkopolskie), należy podjąć działania informacyjne, celem uwrażliwienia hodowców drobiu na konieczność zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do swoich gospodarstw.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy informuje również o obowiązywaniu rozporządzenia MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017r. *w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017r. poz. 722)* oraz prosi o rozpropagowanie ulotek z informacjami na temat ww. choroby wśród hodowców utrzymujących drób (także na potrzeby własne) oraz miejsc w których utrzymywane są inne ptaki.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w Legnicy


Barbara Malecka-Saliwach

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W LEGNICY

z/s ZIEMNICE, UL. LEGNICKA 12, 59-220 LEGNICA

tel.: (76) 855-05-41, fax: (76) 855-05-42,

legnica@wroc.wiw.gov.pl, legnica.piw@wetgiw.gov.pl; www.piwlegnica.pl

INSPEKCJA WETERYNARIJNA
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARIJ
w LEGNICY
z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12
59-220 Legnica, tel./fax (76) 8550541
Regon 390650320, NIP 691-20-30-933

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARIJ W LEGNICY

Wysoco zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków.

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane.

Główne objawy kliniczne wysoco zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie umyć ręce wodą z mydłem.

Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce

**hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność
i stosować odpowiednie środki bioasekuracji
minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:**

- 1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni,
pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych
lub pod szczelnym przykryciem,
uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii,
wójt/burmistrz/prezydent miasta)
podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody;
objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów;
duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności